Coin de la documentaliste – septembre 2022

LA VEILLE INFORMATIONNELLE DE L'ASSTSAS

Ce bulletin présente les documents repérés et diffusés au cours du mois d'août qui portent sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur des affaires sociales. Vous y trouverez aussi un survol des prochains événements de l'ASSTSAS. Notez que les directives de la santé publique sont rassemblées sur notre site et ne se trouvent pas dans ce bulletin.

Des 86 ressources présentées, 70 sont en accès libre, 8 sont disponibles par un abonnement de l'ASSTSAS ou du réseau ISST et 8 sont en accès restreint.

Bonne lecture !

Sommaire

Nouveautés de L'ASSTSAS 2

Agression et violence 3

Agression/violence et COVID-19 3

Déplacement de personnes 3

Equipements 4

Équipements et COVID-19 6

Ergonomie 7

Organisation de la SST 8

Organisation du travail 9

Organisation du travail et COVID-19 10

Risques biologiques 10

Risques biologiques et COVID-19 12

Risques chimiques 14

Santé psychologique 15

Santé psychologique et COVID-19 17

services de garde 19

Troubles Musculosquelettiques 19

NOUVEAUTÉS DE L'ASSTSAS

Publications

La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST) introduit des mécanismes de participation des travailleurs dans l'ensemble des établissements du Québec. Consultez les fiches révisées :

Représentant en santé et en sécurité
(organisations qui comptent 20 travailleurs et plus)

Agent de liaison en santé et en sécurité
(organisations de moins de 20 travailleurs)

Webinaires en rediffusion

Carrefour de la prévention organisationnelle : un nouvel outil de l'INSPQ [2022-011]

Les bonnes pratiques en santé et sécurité du travail lorsqu'on administre un médicament dangereux en clinique [2022-014]

Obligations en prévention du harcèlement psychologique et de la violence conjugale en milieu de travail [2022-010]

Comment reconnaître vos risques psychosociaux en services de garde ? [2022-009]

Services de garde - Comment identifier vos risques en services de garde ? [2022-008]

Prochains midis-causeries

Les midis-causeries de l'ASSTSAS sont une occasion d'échanger de santé et de sécurité du travail. C'est aussi une manière sympathique de prendre votre lunch en compagnie de personnes partageant les mêmes intérêts professionnels !

Voici les trois séries thématiques de l'automne :

Régime intérimaire de la LMRSST

Les outils de l'approche relationnelle de soins

Les facteurs psychosociaux du travail

Prochains événements

Colloque Stress post-traumatique : quand l'urgence d'agir se fait sentir

Colloque ASSTSAS 2022 Ensemble en prévention

http://asstsas.qc.ca/evenements/

AGRESSION ET VIOLENCE

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/agressions-violence/

La violence, l'affaire de tous

Source : *Prévention au travail* 35 (2), 8/9/2022

« Chaque année, près de 20 000 Québécois — des femmes, pour la plupart — continuent d'être victimes d'une infraction commise en contexte conjugal. En fait, au Québec, près du quart de la criminalité contre la personne est attribuable à la violence conjugale1. » C'est dans ce contexte que la LMRSST aborde maintenant spécifiquement la prévention de cette réalité que l'on attribuait habituellement davantage à la sphère personnelle des travailleurs.

AGRESSION/VIOLENCE ET COVID-19

Riding the waves of the pandemic from West to East: The social workers' experience an International collaboration on study of social workers during COVID-19

Source : *Social Work in Health Care* (Prépublication), 8/5/2022

Les objectifs de cette étude collaborative visaient à mettre les travailleurs sociaux et la profession de travailleur social « sur la sellette ». Alors qu'un précédent numéro spécial de cette revue traitait de l'élargissement du champ des rôles et des responsabilités des travailleurs sociaux, notamment lors des premières vagues de la pandémie aux États-Unis (Ross et al., 2021), le présent numéro spécial approfondit les sujets abordés et offre une perspective internationale.

DÉPLACEMENT DE PERSONNES

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/deplacement-de-personnes/

Impact of Ultra-Low Heig/ht Healthcare Beds on Falls and Mobility: A Systematic Review

Source : *International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM)* 12 (1), 3/1/2022 Abonnement

L'objectif de cette revue systématique est d'explorer l'utilisation des lits médicalisés à très faible hauteur concernant les mouvements non assistés des patients assis-debout/marche, y compris les chutes. Conclusions : Le lit ultra-bas peut être utilisé pour favoriser une réduction des risques de blessures dues aux chutes (hauteur plus faible) mais les preuves sont limitées malgré des résultats initiaux très prometteurs.

International Round Table Discussion: The Challenges of Providing Dignified Bathroom Care

Source : *International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM)* 12 (1), 3/1/2022 Abonnement

L'un des éléments les plus fondamentaux et essentiels pour fournir de bons soins aux patients, quel que soit le cadre, est d'adopter une approche digne et respectueuse pour les aider à aller aux toilettes. Pour de nombreux patients, la perte de la capacité à être indépendant dans cette activité la plus privée peut générer beaucoup de stress et des complications potentielles. Trouver un équilibre entre la sécurité (les chutes sont plus nombreuses sur le chemin de la salle de bain) et l'intimité est un défi, mais s'il est géré correctement, il peut faire une grande différence dans la façon dont le patient perçoit son séjour dans un établissement ou lorsqu'il est soigné à domicile. Cette table ronde aborde ces défis et certaines des solutions permettant d'offrir une expérience optimale, sûre et digne dans la salle de bains.

Special Issue : Early Mobility

Source : *International Journal of SPHM* SI-2, 4/1/2022

Ce numéro spécial de l'IJSPHM débute par un article de Margaret Arnold, qui est une experte de premier plan dans le domaine de la mobilité précoce. Margaret nous rappelle que la mobilité précoce ne concerne pas seulement l'unité de soins intensifs, mais l'ensemble du continuum de soins. Suit l'évaluation d'une technologie qui aide les patients à se remettre sur pied. Nous devons également nous assurer que lorsque la technologie est utilisée, le personnel l'utilise en toute sécurité : notre troisième article démontre l'efficacité d'une approche de formation aux compétences pour une utilisation sûre de la technologie de mobilité précoce. Enfin, deux articles sont consacrés aux patients sous oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) et aux solutions pour la mobilisation précoce de ce groupe restreint mais critique de patients dans les unités de soins intensifs.

Transforming Safety at the Bedside with Safe Patient Handling Practice

Source : *International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM)* 12 (1), 3/1/2022 Abonnement

Les troubles musculo-squelettiques liés au travail constituent une préoccupation majeure en matière de sécurité dans le domaine actuel des soins de santé, en raison du soulèvement de patients présentant des niveaux d'acuité plus élevés et de l'obésité. Un centre de traumatologie de niveau I dans l'ouest de l'État de New York a mis en œuvre un programme de manutention sécurisée des patients dans l'ensemble du continuum de soins afin de réduire les blessures des travailleurs de la santé.

ÉQUIPEMENTS

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/equipements/

Communication

Speaking with a KN95 face mask: a within-subjects study on speaker adaptation and strategies to improve intelligibility

Source : *Cognitive Research: Principles and Implications* 7(1), 7/30/2022

Le port de masques pendant la pandémie de COVID-19 a suscité un intérêt croissant pour l'impact fonctionnel des masques sur la parole et la communication. Des travaux antérieurs ont montré que les masques amortissent le son, entravent les indices de communication visuelle et réduisent l'intelligibilité. Cependant, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les locuteurs modifient leur discours lorsqu'ils portent un masque et pour identifier des stratégies permettant de surmonter l'impact du port d'un masque

Masques de protection

Feature, Barrier Face Coverings for Workers

Source : *NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy* En ligne, 7/27/2022 Accès restreint

Cet article décrit brièvement une nouvelle spécification standard ASTM 3502 pour les masques de protection (BFC) et le développement de critères de performance pour les BFC sur le lieu de travail avant les normes temporaires d'urgence (ETS) COVID-19 de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Nous décrivons également une méthode permettant de comparer l'effet sur le temps de réception d'une dose infectieuse (DI) des BFC avec différents degrés de fuite vers l'intérieur (protection personnelle) et vers l'extérieur (contrôle de la source).

Maux de tête

Risk factors for development of personal protective equipment induced headache: e-survey of medical staff in Baltic states

Source : *BMC Health Services Research* 22(1), 8/10/2022

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation sans précédent de l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) parmi le personnel médical. L'objectif de cette étude était de déterminer les facteurs de risque et la fréquence des céphalées dues aux EPI pendant la pandémie de COVID-19.

Protection oculaire

Determinants of nurse's and personal support worker's adherence to facial protective equipment in a community setting during the COVID-19 pandemic in Ontario, Canada: A pilot study

Source : *American Journal of Infection Control* Prépublication, 7/30/2022

L'objectif de cette étude est d'adapter un questionnaire existant sur la protection faciale et de l'utiliser pour développer une compréhension initiale des facteurs influençant l'adhésion des prestataires de soins à domicile à la protection faciale pendant la pandémie de COVID-19.

Effectiveness of 2 Pretreatment Methods in Antifogging of Goggles in a COVID-19 Isolation Ward: A Randomized Controlled Trial

Source : *Journal of Emergency Nursing* Prépublication, 6/1/2022

Cette étude visait à comparer l'efficacité du prétraitement des lunettes de protection avec une solution iodophore et un désinfectant antibactérien pour les mains afin de réduire la formation de buée sur les lunettes de protection.

Protection respiratoire

Assessing the Fit of N95 Filtering Facepiece Respirators Fitted with an Ear Loop Strap System: A Pilot Study

Source : *Annals of Work Exposures and Health* En ligne, 8/4/2022 Abonnement

Tout au long de la pandémie de COVID-19, des centaines de millions de personnes dans le monde sont devenues de nouveaux utilisateurs d'appareils de protection respiratoire. Les masques faciaux et les respirateurs KN95 utilisant un système de sangles de boucle d'oreille (ELSS) sont récemment devenus populaires parmi les populations professionnelles et non professionnelles. Cette popularité est due en partie à la facilité de port par rapport aux appareils traditionnels utilisant deux bandeaux, l'un porté sur la tête et l'autre derrière le cou — un système de sangles universel utilisé dans les masques filtrants N95 certifiés par le NIOSH (FFR). Certains utilisateurs convertissent la configuration à deux sangles en un ELSS réglable. Le premier objectif de cette étude pilote était de caractériser quantitativement l'impact d'une telle conversion sur l'ajustement du respirateur.

Élaborer un programme de protection respiratoire : mode d'emploi

Source : *Prévention au travail* 35 (2), 6/28/2022

Dans les entreprises dont l'air contient des contaminants ou une faible concentration en oxygène, la santé respiratoire des travailleurs pose un enjeu important. Il est donc essentiel qu'elles mettent en place un programme de protection respiratoire (PPR). Toutefois, l'élaboration d'un tel programme n'est pas une mince tâche. Heureusement, le Guide sur la protection respiratoire vient épauler ces milieux de travail dans la mise en œuvre des modifications réglementaires à cet égard.

Improving the fit of filtering facepiece respirators

Source : *British Dental Journal* En ligne, 8/5/2022

L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité et l'acceptabilité de la technologie de cadre personnalisé par smartphone pour améliorer le test d'ajustement des masques jetables de classe 3 (FFP3) pour le personnel dentaire qui a échoué précédemment. des respirateurs jetables à masque filtrant de classe 3 (FFP3) pour le personnel dentaire qui n'a pas réussi le test d'ajustement.

ÉQUIPEMENTS ET COVID-19

Décontamination des ÉPI

Exploring inactivation of SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ebola, Lassa, and Nipah viruses on N95 and KN95 respirator material using photoactivated methylene blue to enable reuse

Source : *American Journal of Infection Control* 50(8), 8/1/2022

Nous avons examiné la décontamination des masques respiratoires N95 et KN95 à l'aide de MB photoactivé et de 3 variantes du SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, et de 4 pathogènes prioritaires de l'Organisation mondiale de la santé : le virus Ebola, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le virus Nipah et le virus Lassa. L'inactivation des virus par prétraitement du matériel respiratoire a également été testée.

Health care worker knowledge and attitudes towards uniform laundering during the COVID-19 pandemic

Source : *American Journal of Infection Control* 50 (5), 5/1/2022

La pandémie de COVID-19 a suscité des inquiétudes quant au lavage à domicile des uniformes des travailleurs de la santé (TS), une pratique courante dans des pays comme le Royaume-Uni (RU) et les États-Unis. Des recherches antérieures ont suggéré que 4 à 32 % des infirmières n'adhéraient pas aux politiques de lavage, ce qui pourrait constituer un risque de contrôle des infections. Cette étude avait pour but d'examiner les connaissances et les attitudes des travailleurs de la santé du Royaume-Uni concernant le lavage à domicile des uniformes pendant la pandémie de COVID-19. Conclusions : La plupart des travailleurs de la santé lavent leurs uniformes à domicile, malgré une préférence pour le lavage professionnel. Un cinquième des travailleurs de la santé s'écartent des directives du NHS britannique en matière d'uniformes ; l'absence de vestiaires sur place constitue l'obstacle le plus important à l'adhésion.

Inactivation strategies for SARS-CoV-2 on surgical masks using light-activated chemical dyes

Source : *American Journal of Infection Control* 50 (8), 8/1/2022

Nous avons examiné la décontamination de la variante Beta du SRAS-CoV-2 sur des masques chirurgicaux et des masques réutilisables Revolution-Zero Environmentally Sustainable (RZES) en utilisant ces colorants photoactivés. Nous avons prétraité les masques chirurgicaux avec 2 concentrations de MB, 2 concentrations de RB et 2 combinaisons de MB et de RB. Nous avons également testé 7 concentrations de MB sur des masques RZES.

Methylene blue applied to N95 respirators and medical masks for SARS-CoV-2 decontamination: What is the likelihood of inhaling methylene blue?

Source : *American Journal of Infection Control* 50(8), 8/1/2022

Un panel de masques respiratoires N95, de masques médicaux et de masques en tissu a été pulvérisé avec 5 cycles de solution de bleu de méthylène 1 000 uM. Les coupons de masques ont été soumis à l'équivalent de 120 L/min d'un débit d'air humidifié à 100 %. Le gaz effluent a été piégé dans une solution aqueuse et le fluide résultant a été échantillonné pour l'absorption de bleu de méthylène avec un niveau de détection de 0,004 mg/m3.

Port prolongé d'équipements de protection individuelle

Adverse effects of personal protective equipment among first line COVID-19 healthcare professionals: A survey in Southern Tunisia

Source : *Infection, Disease & Health* Prépublication, 7/1/2022

Les professionnels de la santé (PSS) ont été obligés de porter des équipements de protection individuelle (EPI) pendant une pandémie afin de minimiser le risque de transmission du virus émergent. L'objectif de l'étude était d'estimer la prévalence des effets indésirables liés au port de l'EPI chez les professionnels de la santé et de déterminer leurs facteurs prédictifs.

Diurnal changes of noninvasive parameters of ocular surface in healthy subjects before and after continuous face mask wearing during the COVID-19 pandemic

Source : *Scientific Reports* 12(1), 12/1/2022

L'objectif était d'étudier si des changements diurnes des paramètres non invasifs de la surface oculaire et des symptômes subjectifs se produisent chez des sujets sains portant un masque facial qui ont été analysés avant et après 8 heures d'utilisation continue.

FFP3 Feelings and Clinical Experience (FaCE). Facial pressure injuries in healthcare workers from FFP3 masks during the COVID-19 pandemic

Source : *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery* Prépublication, 6/1/2022

Le port prolongé de masques à masque filtrant 3 (FFP3) pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné des dermatoses, notamment des escarres. Cette étude visait à mieux comprendre l'échelle locale et la nature du problème, les stratégies d'adaptation et l'impact sur les personnes concernées.

Is the whole-day use of Surgical Masks during the Coronavirus Pandemic increasing the Contamination of Surgeons' Masks?

Source : *American Journal of Infection Control* (Prépublication), 8/5/2022

L'évaluation de l'impact des pratiques de conservation des masques chirurgicaux pendant la pandémie de coronavirus sur la charge biologique du bloc opératoire semble impérative, car ils jouent un rôle critique contre cette pandémie. Nous démontrons que les masques des chirurgiens ont tendance à être contaminés en raison des techniques de conservation visant à maximiser l'équipement de protection pendant la pandémie. Les établissements de santé devraient souligner l'importance de l'échange des masques chirurgicaux afin d'éviter l'augmentation de la contamination des masques chirurgicaux.

Utilisation des EPI

Quantification of diurnal variation in "glove hygiene" compliance in COVID ICUs: an exploratory study

Source : *American Journal of Infection Control* Prépublication, 7/1/2022

L'objectif de l'étude était de déterminer la variation diurne du respect de l'hygiène des mains chez différentes catégories de travailleurs de la santé dans un hôpital de soins tertiaires du nord de l'Inde.

Use of recommended personal protective equipment among Brazilian health professionals during the COVID-19 pandemic

Source : *Work* Prépublication, 7/25/2022

L'objectif de cette étude était d'analyser l'utilisation de l'EPI chez les professionnels de santé brésiliens et les facteurs associés pendant une période de pandémie de COVID-19.

ERGONOMIE

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/ergonomie/

Assessment of Physical Work Demands of Home Care Workers in Norway: An Observational Study Using Wearable Sensor Technology

Source : *Annals of Work Exposures and Health* (En ligne), 8/12/2022

On pense que les exigences physiques élevées du travail sont en partie responsables du taux élevé d'absentéisme pour cause de maladie chez les travailleurs à domicile, mais aucune étude n'a évalué les exigences physiques du travail à l'aide de mesures précises basées sur des appareils.

Visual ergonomics, performance and the mediating role of eye discomfort: A structural equation modelling approach

Source : *International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE* (Prépublication), 8/9/2022 Abonnement

L'objectif de cette étude était de modéliser les facteurs ergonomiques visuels affectant la performance dans l'interaction personne-machine. Une étude transversale utilisant un modèle d'équation structurelle a été réalisée sur un échantillon de 200 participants.

Working from home and ergonomics

Source : *Heartland Center for Occupational Health & Safety. Annual report, July2020-June 2021*, 2022

Au fur et à mesure que de nouvelles recherches émergeaient sur les impacts sur la santé physique et mentale des mandats de travail à domicile COVID-19, les chercheurs ont administré l'enquête longitudinale sur le bien-être des employés. L'enquête comprenait plusieurs mesures validées de la santé mentale, du bien-être et du stress professionnel, ainsi que des questions sur les douleurs musculo-squelettiques, l'environnement du bureau à domicile et l'utilisation des équipements. Les résultats suggèrent que les employés ayant accès à des chaises de bureau réglables avec des accoudoirs et à des environnements de travail permettant d'alterner entre les postures assise et debout ont de 38 à 56 % moins de chances de signaler des douleurs musculo-squelettiques que les employés ne disposant pas de ces mêmes caractéristiques de bureau à domicile. Dans l'ensemble, l'étude fournit des suggestions tangibles et peu coûteuses d'améliorations du bureau à domicile qui peuvent réduire les douleurs musculo-squelettiques des employés et améliorer la santé et le bien-être général des employés à distance.

ORGANISATION DE LA SST

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-de-la-sst/

Évaluation des actions de prévention en santé au travail

Source : *Pathologie professionnelle et de l'environnement* (Prépublication), 8/5/2022

L'évaluation d'une action ne doit pas se centrer uniquement sur les conséquences observées, mais intégrer également des éléments sur l'action elle-même, sur le processus et sur le contexte dans lequel elle se situe. Les méthodes d'évaluation utilisées dérivent de la recherche épidémiologique où l'accent est mis sur les conséquences, ou de la recherche en sciences sociales où l'accent est davantage mis sur les processus.

Examining the role of supervisory and co-worker safety support in mediating the relationship between safety climate and safety performance

Source : *Safety Science* 155, 11/1/2022 Abonnement

L'objectif de l'enquête actuelle était d'entreprendre une étude longitudinale à plusieurs niveaux impliquant le personnel de première ligne des services d'incendie et de secours afin d'évaluer dans quelle mesure les effets du climat de sécurité se déploient dans le temps et ont un impact sur le respect de la sécurité et la participation via le soutien lié à la sécurité fourni par les superviseurs directs et les collègues.

Planification des travaux règlementaires 2021-2023 de la CNESST : mise à jour

Source : CNESST, 5/1/2022

La planification des travaux réglementaires 2021-2023 de la CNESST, volet santé et sécurité du travail, s'appuie sur les propositions des comités-conseils réglementaires qui sont responsables de soutenir le conseil d'administration dans l'évolution réglementaire et dans le suivi des réalisations de 2020. Cette planification précise les besoins, les objectifs et les échéanciers pour la période de 2021 à 2023 concernant les modifications requises aux normes et aux règlements qui sont sous la responsabilité de la CNESST.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-du-travail/

Communication

Développez vos talents de communicateur en 7 étapes

Source : *Revue Gestion* (En ligne), 8/12/2022

Profitez de ce moment pour vous questionner sur vos habiletés et posez un regard objectif sur vos qualités de communicateur. Voici comment faire.

Vu d'ailleurs —La satisfaction de la clientèle

Source : *Revue Gestion* 47 (2), 8/16/2022

Le client est roi, dit le dicton. Mais tout roi a ses caprices et les satisfaire est un art que les entreprises n'ont guère le choix de cultiver. Des spécialistes font le point sur certaines tendances internationales en marketing.

Horaire de travail

Shift work with and without night shifts and breast cancer risk in a cohort study from Finland

Source : *Occupational and Environmental Medicine* (Prépublication), 8/10/2022

L'objectif de cette étude était d'examiner l'association entre le travail posté, avec ou sans travail de nuit, et le cancer du sein chez les femmes du secteur public.

Travail hybride

Gestion hybride : créer un réel sentiment d'inclusion

Source : *Revue Gestion* (En ligne), 11/18/2021

Le télétravail s'est imposé au cours de la dernière année dans plusieurs milieux de travail. Avec le retour à la normale qui se dessine à l'horizon, il est temps d'anticiper les nouveaux enjeux de la gestion en mode hybride.

Hybrid Work Toolkit

Source : *The Conference Board of Canada*, 2022

Le monde du travail évolue. Les entreprises ont tout intérêt à combiner le travail sur place et le travail à distance. Ce modèle hybride offre des possibilités exceptionnelles de remodeler la culture, d'accroître la productivité, de réduire les coûts et bien d'autres choses encore — mais non sans avoir à surmonter des difficultés en cours de route. La boîte à outils du travail hybride présente nos principales recommandations aux entreprises qui font la transition vers des modalités de travail flexibles.

L'IA pour la gestion des travailleurs : risques et possibilités en matière de SST

Source : *Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail*, 8/11/2022

Un nouveau rapport met en évidence les risques et les possibilités que les systèmes de gestion des travailleurs fondée sur l'intelligence artificielle présentent pour la santé et la sécurité au travail.

ORGANISATION DU TRAVAIL ET COVID-19

Guaranteeing Dignity and Decent Work for Migrant Nurses and Healthcare Workers Beyond the COVID-19 Pandemic

Source : *Journal of Nursing Management* (Prépublication), 8/9/2022

L'objectif principal de cet article est de présenter les effets dévastateurs de la COVID-19 en termes de recrutement éthique et de respect de la dignité des infirmières et des professionnels de la santé.

Service Workers' Experience and Perceptions of Workplace Protective Measures During the Onset of COVID-19

Source : *Workplace Health & Safety* (En ligne), 8/8/2022 Abonnement

La pandémie de coronavirus-2019 (COVID-19) représente un fardeau unique pour les travailleurs du secteur des services. Cependant, il existe peu de recherches sur l'expérience des travailleurs du secteur des services pendant l'apparition du COVID-19. Cette étude a cherché à décrire les expériences et les préoccupations des travailleurs du secteur des services pendant le début de la pandémie.

Strategies to manage working from home during the pandemic: the employee experience

Source : *Industrial Health* 60 (4), 5/11/2022

De nombreux travailleurs australiens ont été mandatés pour travailler à domicile pendant la pandémie de COVID-19. En utilisant une approche qualitative, cette étude visait à identifier les stratégies optimales de gestion du travail à domicile. Les expériences de la plupart des participants ont été plus négatives que positives, en partie à cause des fermetures extrêmes, y compris les couvre-feux, et des fermetures de garderies et d'écoles qui ont aggravé leurs expériences. Les stratégies efficaces initiées par le lieu de travail pour optimiser le travail à domicile comprenaient : le soutien de la direction pour des heures de travail flexibles ; la fourniture de l'équipement nécessaire avec le soutien des TIC ; la communication en ligne régulière ; les ajustements de la gestion des performances ; et la formation des gestionnaires.

Working from home during the COVID-19 pandemic: The association with work productivity loss among patients and caregivers

Source : *Journal of Occupational and Environmental Medicine* (Prépublication), 8/6/2022 Abonnement

L'objectif de cette étude était de mesurer l'association du travail à domicile (TAD) avec la perte de productivité au travail due aux responsabilités de soins ou aux problèmes de santé pendant la pandémie de COVID-19.

RISQUES BIOLOGIQUES

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-biologiques/

Contamination des surfaces

Environmental sampling practices of innate hospital surfaces. A need for guidance and consensus? A survey conducted by the ESCMID Study Group for Nosocomial Infections (ESGNI)

Source : *Journal of Hospital Infection* (Prépublication), 8/6/2022 Accès restreint

Les surfaces dans les établissements de santé peuvent constituer des réservoirs d'infection. À l'heure actuelle, il n'existe aucun protocole normalisé indiquant quand et comment prélever des échantillons de surfaces

hospitalières. Un questionnaire en ligne a été conçu pour mieux comprendre les pratiques d'échantillonnage actuelles et a été distribué par courriel à un public ciblé de prévention et de contrôle des infections.

High-Contact Object and Surface Contamination in a Household of Persons with Monkeypox Virus Infection—Utah, June 2022

Source : *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report* 71, 8/19/2022

Ce rapport décrit la contamination des objets et des surfaces dans un foyer de patients atteints de la variole du singe dans l'Utah.

Infections nosocomiales

Germs Lead the Way: Exploring Microbial Ecology to Elevate the Fight Against Antimicrobial-resistant Healthcare-associated Infections

Source : *Safe Healthcare blog*, 8/18/2022

Le CDC sait qu'il existe un lien important entre l'écologie microbienne, nos microbiomes, et la santé et le bien-être des personnes. Les experts en santé publique de la Division of Healthcare Quality Promotion du CDC souhaitent mieux comprendre ce lien pour aider à prévenir les infections, notamment les infections résistantes aux antimicrobiens (AR).

Prévention des infections

Debate examines conflicts between life safety and infection prevention

Source : *Health Facilities Management* (En ligne), 8/5/2022

Des experts en prévention des infections et en sécurité des personnes ont animé une session de conférence sur la manière dont ces deux domaines peuvent se soutenir mutuellement.

Orientation pour les responsables de la prévention et du contrôle des infections en milieux de soins de longue durée

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario)., 2022

Cette liste de vérification peut être utilisée par les responsables de la prévention et du contrôle des infections (PCI) et leurs superviseurs pour sélectionner les domaines d'intérêt en matière d'apprentissage, de perfectionnement professionnel et de planification. Les responsables de la PCI peuvent se servir de cette feuille de route à titre de guide pour acquérir les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour exercer efficacement leurs fonctions.

Transmission aérienne

Assessing suspension and infectivity times of virus-loaded aerosols involved in airborne transmission

Source : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119 (32), 8/9/2022 Accès restreint

La transmission par voie aérienne se produit par le transport de virus par les gouttelettes après l'expulsion d'un aérosol par un hôte infecté. L'efficacité de la transmission résulte de l'interaction entre la survie du virus dans la gouttelette qui sèche et le temps de suspension de la gouttelette dans l'air, contrôlé par le couplage entre l'évaporation de l'eau et la sédimentation de la gouttelette. En outre, les gouttelettes sont constituées d'un fluide respiratoire et présentent donc une composition complexe composée d'eau et de solutés non volatils. Ici, nous quantifions l'impact de cette composition complexe sur les différents phénomènes qui sous-tendent la transmission.

Dynamics of charged aerosols relevant to transmission of airborne infections

Source : *Physica Scripta* 97 (8), 8/1/2022 Accès restreint

Un modèle simple incluant les effets de la vitesse initiale, de la résistance de l'air, de la gravité et de l'électrostatique sur la dynamique des gouttelettes en suspension dans l'air émises par les humains est présenté. On constate que des gouttelettes relativement grosses peuvent aussi voyager loin si leur charge et/ou le champ électrique atmosphérique est suffisamment grand.

Virus Dynamics and Decay in Evaporating Human Saliva Droplets on Fomites

Source : *Environmental Science & Technology* En ligne, 7/29/2022 Accès restreint

Cette étude examine la structure et la dynamique de l'évaporation des gouttelettes de salive contenant des virus sur les fomites et leur impact sur la viabilité des virus en utilisant quatre virus modèles : le virus de la stomatite vésiculaire, le virus de l'herpès simplex 1, le virus de la maladie de Newcastle et le coronavirus HCoV-OC43.

RISQUES BIOLOGIQUES ET COVID-19

Arbre décisionnel

Risk-Based Model to Resume Field Research and Public Health Service During the COVID-19 Pandemic

Source : , 8/24/2022

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux lieux de travail dans le monde ont strictement limité ou cessé les activités en personne, y compris certaines parties du gouvernement fédéral. Alors qu'une grande partie du travail se poursuivait à distance, le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) a dû prendre des décisions concernant l'autorisation des employés à voyager pour mener des recherches sur le terrain en matière de sécurité et de santé au travail et des travaux de service de santé publique. Pour faciliter ces décisions, le NIOSH a mis au point un modèle fondé sur le risque pour effectuer des travaux sur le terrain, en équilibrant les avantages de ces travaux pour la santé publique et les risques d'exposition et de transmission du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2).

Contamination des surfaces

Environmental detection of SARS-CoV-2 in hospital rooms in different wards of an University Hospital

Source : *Journal of Hospital Infection* (Prépublication), 8/6/2022

L'excrétion virale pendant la période Covid-19 ne semble pas liée à la présence de symptômes, à l'âge du patient et au seuil de cycle de valeur faible du test du patient. Cette étude confirme la preuve de l'excrétion environnementale du SRAS-CoV-2 jusqu'à au moins 7 jours après l'apparition des symptômes du patient. Elle souligne la nécessité d'un respect strict des précautions à prendre en cas de contact, de l'hygiène des mains, de l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle et de la désinfection des chambres pour les soins de routine des patients atteints du syndrome Covid-19.

Désinfection

Pollution free UV-C radiation to mitigate COVID-19 transmission

Source : *Gondwana Research* Prépublication, 8/1/2022

Dans cet article de synthèse, des efforts ont été faits pour évaluer les aspects techniques de la technologie UV-C (222 nm). d'évaluer les aspects techniques des UV (sous les différents spectres et gammes de longueurs d'onde) et le contrôle de la COVID 19. et le contrôle de la propagation du virus COVID 19 dans l'atmosphère, y compris les possibilités d'une la désinfection en condition de travail

Infections nosocomiales et infections associées aux soins

Study shows outsized COVID impact on community hospitals

Source : *CIDRAP*, 8/25/2022

L'étude, publiée cette semaine dans Clinical Infectious Diseases par une équipe de chercheurs de l'université de Duke et de l'université de Caroline du Nord, a révélé que les taux d'infections sanguines associées aux cathéters centraux (CLABSI), d'événements associés aux ventilateurs (VAE) et d'infections à Clostridioides difficiles (CDI) dans les hôpitaux de six États du sud-est ont augmenté de manière significative pendant la pandémie par rapport aux années précédentes. Mais c'est dans les petits hôpitaux communautaires que l'impact a été le plus marqué.

The Disproportionate Impact of COVID-19 Pandemic on Healthcare-Associated Infections in Community Hospitals: Need for Expanding the Infectious Disease Workforce

Source : *Clinical Infectious Diseases* (En ligne), 8/23/2022

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les systèmes de santé américains, mettant à rude épreuve les ressources, le personnel et les opérations des hôpitaux. Cependant, il n'existe pas d'évaluation complète de l'impact sur les infections associées aux soins (IAS) dans différents hôpitaux dont le niveau d'expertise des médecins spécialisés en maladies infectieuses, les ressources et les infrastructures varient. Cette étude de cohorte rétrospective longitudinale multicentrique a porté sur les infections sanguines associées aux cathéters centraux (CLABSI), les infections urinaires associées aux cathéters (CAUTI), les infections à C. difficile (CDI) et les événements associés aux ventilateurs (VAE) de 53 hôpitaux (universitaires et communautaires) du sud-est des États-Unis du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.

The Role of Staff in Transmission of SARS-CoV-2 in Long-term Care Facilities

Source : *Epidemiology* 33 (5), 9/1/2022

Les établissements de soins de longue durée (ESLD) américains ont subi une charge disproportionnée de morbidité et de mortalité liée au COVID-19.

Syndrome post-COVID-19

Return to work considerations in the lingering COVID-19 Era: Long COVID, multiple chemical sensitivity, and universal design

Source : *Work* Prépublication, 8/1/2022

Cet article traite de l'impact du COVID-19 sur la main-d'œuvre américaine, des symptômes du syndrome du COVID-19, la sensibilité chimique multiple, et des moyens d'éviter de déclencher ses symptômes lors de l'assainissement du lieu de travail et de l'utilisation des pratiques de conception universelle pour augmenter l'accessibilité et diminuer la transmission du COVID-19 parmi les travailleurs. L'accent est mis sur l'interface avec les prestataires de soins de santé, les professionnels de la réadaptation et les employeurs.

Taux d'incidence

Measuring work-related risk of COVID-19: comparison of COVID-19 incidence by occupation and industry—Wisconsin, September 2020-May 2021

Source : *Clinical Infectious Diseases* En ligne, 8/4/2022

De septembre 2020 à mai 2021, le département des services de santé du Wisconsin a recueilli des données sur les professions et les industries dans le cadre des enquêtes de routine sur les cas de COVID-19. Les adultes âgés de 18 à 64 ans présentant un COVID-19 confirmé ou probable au Wisconsin se sont vus attribuer des codes de profession et d'industrie standardisés. Les taux d'incidence cumulatifs ont été pondérés en fonction des non-réponses et calculés à l'aide des dénominateurs de la main-d'œuvre en équivalent temps plein (ETP) de l'American Community Survey de 2020.

Risk factors for COVID-19 Virus Infection among Health Workers: A Case-control study in the Bono East Region of Ghana

Source : *American Journal of Infection Control* (Prépublication), 8/12/2022

Les taux disproportionnés d'infection au COVID-19 parmi les travailleurs de la santé la nécessité d'identifier les facteurs de risque pour aider à guider la conception et la mise en œuvre d'interventions. interventions. L'objectif de cette étude était de caractériser les facteurs de risque de l'infection à COVID-19 chez les travailleurs de la santé.

Travailleurs de la santé

Enquête sur les expériences vécues par les travailleurs de la santé pendant la pandémie : fichier de microdonnées à grande diffusion

Source : *Statistique Canada*, 8/22/2022

Ce fichier de microdonnées à grande diffusion comprend des renseignements qui vise à comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les travailleurs de la santé canadiens en mettant un accent particulier sur le type d'emploi et le milieu de travail, les pratiques et protocoles en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) et d'équipement de protection

Vaccination

Predictors of COVID-19 Vaccine Uptake in Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study in Greece

Source : *Journal of Occupational and Environmental Medicine* 64 (4), 4/1/2022

Cette étude par sondage en ligne auprès de 885 travailleurs de la santé a évalué l'adoption d'un vaccin COVID-19 et les facteurs associés. La majorité des travailleurs de la santé ont été vaccinés contre le COVID-19 (91,5 %). Les femmes et les travailleurs de la santé ayant des antécédents de vaccination contre la grippe saisonnière avaient une plus grande probabilité de se faire vacciner contre le COVID-19. En outre, une meilleure connaissance autoperçue de la pandémie de COVID-19 et une plus grande confiance dans les vaccins COVID-19 étaient associées à la prise du vaccin COVID-19.

A post-occupancy study of ventilation effectiveness from high-resolution CO2 monitoring at live theatre events to mitigate airborne transmission of SARS-CoV-2

Source : *Building and Environment* 223, 9/1/2022

Les événements de rassemblement de masse ont été fermés dans le monde entier en 2020 afin de minimiser la propagation du virus SRAS-CoV-2. Les recherches émergentes sur la transmission du SRAS-CoV-2 ont souligné l'importance d'une ventilation suffisante. Cet article présente les résultats d'une étude de surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) sur 82 événements dans sept auditoriums ventilés mécaniquement pour soutenir le programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique.

Ventilation

Displacement ventilation to avoid COVID-19 transmission through offices

Source : *Computational Particle Mechanics* En ligne, 7/25/2022

Cet article étudie, à l'aide de simulations CFD comment les systèmes de ventilation par déplacement peuvent fournir une qualité d'air élevée, un confort thermique et minimiser le risque d'infection COVID-19 d'infection dans les espaces clos.

RISQUES CHIMIQUES

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-chimiques/

Acute respiratory distress after exposure to chlorine dioxide-based disinfectant

Source : *Occupational Medicine*, 8/6/2022

Un nettoyeur d'hôpital a développé une détresse respiratoire aiguë après avoir travaillé avec un désinfectant à base de dioxyde de chlore. La teneur en dioxyde de chlore dans le produit est inférieure à la limite qui exigerait que le produit soit étiqueté comme dangereux pour la santé, mais nous montrons par une simple estimation que les valeurs limites de seuil pertinentes pour le dioxyde de chlore dans l'atmosphère de travail peuvent être dépassées lors d'une utilisation normale du produit. Cela peut avoir des implications pour l'évaluation des risques liés à l'utilisation de ces désinfectants à base de dioxyde de chlore et peut justifier une réglementation plus stricte pour l'étiquetage de ces produits.

CCHST : Infographie sur le travail à la chaleur

Source : *CCHST : Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail*, 8/5/2022

Cette infographie décrit les mesures à prendre pour réduire les effets de la chaleur, les signes d'un épuisement par la chaleur et d'un coup de chaleur ainsi que les façons dont les employeurs, les employés et les superviseurs peuvent agir.

Travail + chaleur = Boire… eau cas !

Source : *Centre d'expertise en santé de Sherbrooke*, 2022

Cette capsule s'adresse aux travailleurs et employeurs du Québec. À la suite du visionnement, vous serez en mesure de connaitre les symptômes reliés à la chaleur, d'identifier les situations à risque et de mettre en place les mesures préventives. Formation interactive en ligne.

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/sante-psychologique/

Gestionnaires

Du répit pour les gestionnaires

Source : *Revue Gestion* (Article Web), 7/11/2022

Lors de grandes turbulences, ce sont les gestionnaires et des leaders d'équipes qui demeurent au front, permettant aux équipes de garder le cap et de rester à bord du navire. Or, il est temps pour eux de reprendre leur souffle en adoptant le leadership partagé.

Personnel infirmier

Factors associated with satisfaction and depressed mood among nursing home workers during the covid-19 pandemic

Source : *Journal of Clinical Nursing* (En ligne), 6/22/2022

Cet article vise à examiner la satisfaction et l'humeur dépressive ressenties par les travailleurs des maisons de retraite pendant la pandémie de COVID-19 et les variables associées. Plus précisément, il s'agit d'analyser les facteurs qui peuvent contribuer à ce que les travailleurs des maisons de retraite développent des comportements adaptatifs qui favorisent la satisfaction ou, au contraire, présentent des caractéristiques associées à une humeur négative.

The moderating effect of burnout on professionalism, values, and competence of nurses in Saudi Arabia amidst the COVID-19 pandemic: A structural equation modeling approach

Source : *Journal of Nursing Management* (Prépublication), 8/8/2022

L'objectif de cette étude était d'examiner l'effet modérateur de l'épuisement professionnel sur la relation entre la compétence des infirmières, la compétence professionnelle et les valeurs professionnelles.

Towards a New Conceptual Model for Nurses' Organizational Well-being: An Integrative Review

Source : *Journal of Nursing Management* (Prépublication), 8/9/2022 Accès restreint

L'objectif de cette étude était de résumer les modèles conceptuels du bien-être organisationnel des infirmières et identifier les variables communes à ces modèles.

Verbal Violence and Turnover Intention Among New Nurses in Korea: A Time-Lagged Survey

Source : *Journal of Nursing Management* (Prépublication), 8/8/2022 Accès restreint

L'objectif de cette étude était de tester un modèle examinant l'impact de la violence verbale à l'encontre des nouvelles infirmières sur leur intention de rotation et les effets médiateurs de la réaction émotionnelle et de l'épuisement professionnel en se basant sur la théorie des événements affectifs.

Présentéisme

Should I stay or should I go? The role of daily presenteeism as an adaptive response to perform at work despite somatic complaints for employee effectiveness

Source : *Journal of Occupational Health Psychology* 27(4), 2022

Notre étude vise à contribuer à la compréhension scientifique des antécédents et des conséquences des fluctuations quotidiennes intrapersonnelles du présentéisme. Les cadres théoriques du présentéisme le conceptualisent comme un comportement adaptatif permettant de fournir des performances professionnelles malgré les limitations dues à une mauvaise santé. Nous intégrons la théorie de l'épuisement de l'ego pour soutenir que le présentéisme nécessite une autorégulation pour supprimer les cognitions, les émotions et les réponses comportementales associées à la maladie et se concentrer sur l'accomplissement de ses tâches professionnelles. En conséquence, nous prédisons que le présentéisme épuise les ressources de régulation des employés et nuit à leur engagement au travail et à leur performance le lendemain.

Risques psychosociaux

Delegation and consultation on operational and tactical issues: Any difference in their potentialities for a healthier psychosocial work environment?

Source : *American Journal of Industrial Medicine* (Prépublication), 8/8/2022

Les auteurs concluent que si la participation directe ne change pas la structure du pouvoir, elle peut être une intervention utile au niveau de l'entreprise pour réduire les expositions psychosociales liées au travail et les maladies associées chez les travailleurs manuels, et par conséquent pour diminuer les expositions professionnelles et les inégalités en matière de santé.

Intervenir sur les risques psychosociaux du travail : leviers et stratégies de mobilisation

Source : INSPQ, 8/16/2022

Il peut parfois être difficile d'obtenir l'adhésion d'un milieu de travail à une démarche d'identification et d'évaluation des risques psychosociaux du travail. Cette fiche propose quelques stratégies pour faire face aux différentes objections soulevées par le représentant ou la représentante du milieu de travail, en s'appuyant sur les principes de l'entrevue motivationnelle.

Risques psychosociaux du travail : des risques à la santé mesurables et modifiables

Source : INSPQ, 8/16/2022

Les facteurs de risques psychosociaux du travail sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales. Ce sont des risques identifiables, mesurables et modifiables. Plus spécifiquement, ces risques sont : la charge de travail élevée ; la faible reconnaissance ; la faible autonomie au travail ; le faible soutien des collègues ou des supérieurs ; le manque de communication et d'information ; le harcèlement psychologique.

Télétravail

Workload and mental well-being of homeworkers: The mediating effects of work-family conflict, sleeping problems, and work engagement

Source : *Journal of Occupational and Environmental Medicine* (Prépublication), 8/6/2022

Basée sur la théorie de la conservation des ressources, cette étude transversale examine la relation entre la charge de travail des employés qui travaillent à domicile et leur bien-être mental. Le conflit travail-famille, les problèmes de sommeil et l'engagement au travail sont proposés comme médiateurs.

Travailleurs de la santé

2021 Findings : Public Health Workforce Interests and Needs Survey

Source : *de Beaumont Foundation*, 2022

La seule enquête représentative au niveau national des agents de santé publique des États et des collectivités locales. Interagissez avec les données et explorez l'impact de COVID-19.

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET COVID-19

Interventions psychosociales

Efficacité des interventions psychosociales pour prévenir et traiter les symptômes et troubles mentaux courants. État des connaissances

Source : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), 2022

Les symptômes et troubles mentaux courants, dont l'anxiété et la dépression, affectent une proportion importante de la population. Les besoins de services en santé mentale sont nombreux et se sont accrus depuis le début de la pandémie de la COVID-19. La présente synthèse des connaissances a pour objectif de documenter l'efficacité de diverses interventions psychosociales visant à prévenir et traiter les symptômes et troubles mentaux courants.

Personnel infirmier

Improvement of the Psychosocial Support for Frontline Nurses in Public Hospitals During Covid-19 Pandemic

Source : *Journal of Nursing Management* (Prépublication), 8/8/2022

L'objectif de cette étude était d'explorer et de décrire le soutien psychosocial des infirmières de première ligne pendant la pandémie de COVID-19 dans le district de Tshwane, province de Gauteng, Afrique du Sud.

Télétravail

Gender difference in working from home and psychological distress— A national survey of U.S. employees during the COVID-19 pandemic

Source : *Industrial Health* 60(4), 2022

La pandémie de COVID-19 a précipité des changements vastes et importants dans la façon dont les gens vivent et travaillent. Si le sujet général du travail à domicile a récemment fait l'objet d'une attention accrue, peu d'études ont évalué les différences entre les sexes en matière de vulnérabilité aux effets potentiels du travail à domicile sur la santé mentale.

Travailleurs de la santé

Comparing the Psychological Problems Among the Healthcare Workers Across Two Waves of SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic: An observational study from India

Source : *Disaster Medicine and Public Health Preparedness* Prépublication, 7/28/2022

Il n'existe pas de littérature sur l'évolution des problèmes psychologiques des travailleurs de la santé (TS) au cours de la pandémie de COVID-19. Nous avons cherché à comparer les problèmes psychologiques et les attitudes envers le travail parmi eux au cours de deux vagues de la pandémie de COVID 19 en Inde.

Symptoms of Mental Health Conditions and Suicidal Ideation Among State, Tribal, Local, and Territorial Public Health Workers

Source : *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report* 71(29), 7/1/2022

En 2021, les travailleurs de la santé publique ont signalé des niveaux élevés de symptômes d'au moins un problème de santé mentale (dépression, anxiété ou syndrome de stress post-traumatique [SSPT]). Une enquête menée en 2022 auprès de 26 069 travailleurs de la santé publique a montré qu'une prévalence plus élevée de SSPT était associée à un plus grand nombre d'heures de travail hebdomadaires et à davantage de temps consacré aux activités d'intervention dans le cadre de l'enquête COVID-19. La plupart (75,5 %) des répondants ne pensaient pas que leur employeur augmentait le soutien à la santé mentale. Pour soutenir la santé mentale des travailleurs de la santé publique, les agences de santé publique peuvent modifier les facteurs liés au travail, notamment en apportant des changements organisationnels pour les interventions d'urgence et en facilitant l'accès aux ressources et services de santé mentale.

Workplace Perceptions and Experiences Related to COVID-19 Response Efforts Among Public Health Workers

Source : *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report* 71(29), 7/1/2022

L'enquête sur les intérêts et les besoins de la main-d'œuvre en santé publique de 2021 a enregistré les perspectives de la main-d'œuvre gouvernementale en santé publique. Outre le financement, 51 % des répondants ont indiqué qu'ils avaient besoin de personnel supplémentaire pour répondre à l'épidémie COVID-19. Environ 40 % de la main-d'œuvre a l'intention de quitter son emploi au cours des cinq prochaines années. La planification de la relève et l'attention portée au recrutement et à la fidélisation, qui favorisent la diversité, seront essentielles à la reconstruction de la main-d'œuvre pendant l'évolution de la pandémie de COVID-19.

Travailleurs en milieu d'hébergement et soins de longue durée

Fear of COVID-19, emotional exhaustion, and care quality experience in nursing home staff during the COVID-19 pandemic

Source : *Archives of Gerontology and Geriatrics* 102, 9/1/2022

Le personnel des maisons de soins infirmiers a subi un impact négatif tout au long de la pandémie de COVID-19, faisant face à des difficultés pour fournir des soins aux patients. L'objectif de cette étude était d'explorer la perception des travailleurs de la santé concernant leur propre expérience de la qualité des soins dans les maisons de repos pendant la pandémie de COVID-19. Au milieu de la deuxième vague de la pandémie, nous avons étudié les relations entre la peur du COVID-19 et les expériences de qualité des soins dans les maisons de retraite, avec l'épuisement émotionnel comme rôle médiateur. Nous avons émis l'hypothèse que l'épuisement émotionnel est associé à la peur du COVID-19 et à la qualité des soins vécus par le personnel des maisons de retraite. De plus, nous avons prédit que l'épuisement émotionnel serait le médiateur des relations entre la peur du COVID-19 et l'expérience de la qualité des soins.

Mental Health of Caregivers Working in Nursing Homes during the COVID-19 Pandemic

Source : *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 51 (3), 2022

De nombreux rapports ont fait état d'éclosions de grappes COVID-19 dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Les soignants travaillant dans des maisons de soins de longue durée ont connu une détresse psychologique accrue et se sont inquiétés de la détérioration de leur santé mentale. Cette enquête en ligne à grande échelle, menée de septembre 2020 à mars 2021, a exploré la santé mentale des soignants travaillant dans de tels établissements pendant la pandémie de COVID-19, dans le but d'identifier leurs besoins de soutien. Nous avons constaté que ces

soignants étaient exposés à des niveaux élevés de stress pendant la pandémie de COVID-19 et présentaient un risque élevé de développer une dépression et une anxiété.

SERVICES DE GARDE

Hard-to-staff centers: Exploring center-level variation in the persistence of child care teacher turnover

Source : *Early Childhood Research Quarterly* 61, 10/1/2022 Accès restreint

Les taux élevés de roulement du personnel enseignant dans les garderies ont des répercussions négatives sur les expériences d'apprentissage des jeunes enfants et sur les efforts visant à améliorer la qualité des services de garde. Des recherches antérieures ont exploré la prévalence et les prédicteurs du roulement au niveau des enseignants individuels, mais on en sait moins sur le roulement au niveau des centres — plus précisément, comment le roulement varie entre les centres de garde d'enfants ou si les problèmes de dotation en personnel persistent année après année pour certains centres. Cette étude suit les taux de roulement annuels de tous les centres de garde d'enfants financés par des fonds publics qui fonctionnaient de manière continue en Louisiane entre les années scolaires 2015-16 et 2018-19.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

Voir les dernières publications de cette catégorie :
https://coin.documentaliste.asstsas.com/category/troubles-musculosquelettiques/

Association between home office ergonomics and musculoskeletal pain

Source : University of Iowa, 8/1/2021

L'objectif de cette étude était d'explorer l'association entre l'ergonomie du bureau à domicile et les douleurs musculo-squelettiques déclarées par les travailleurs à distance pendant la période COVID-19. [Les résultats] suggèrent que le fait de disposer d'une chaise de bureau réglable, de la possibilité de soutenir les bras et de la possibilité de se tenir debout pendant le travail est associé à une diminution des douleurs musculo-squelettiques par rapport au fait de ne disposer d'aucune de ces caractéristiques. Les estimations observées sont cohérentes avec la littérature antérieure, et l'association entre l'ergonomie du bureau à domicile et les douleurs musculo-squelettiques déclarées fournit une base pour simplifier les recommandations des employeurs concernant l'ergonomie pour les employés à distance.

Association between low back pain, workaholism, and work engagement in Japanese hospital workers: A quantitative cross-sectional study

Source : *Journal of Occupational and Environmental Medicine* (Prépublication), 8/6/2022

L'objectif de cette étude était d'examiner l'association entre deux types d'investissement dans le travail lourd, le workaholism et l'engagement au travail, et la prévalence de la lombalgie.